



Fingolimod **+pharma**

Karta przypominająca
dla pacjentek dotycząca ciąży

Karta przypominająca dla pacjentek dotycząca ciąży

Fingolimod +pharma (Fingolimodum)

Lek Fingolimod +pharma jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym (w tym nastoletnich dziewcząt) nie stosujących skutecznej antykoncepcji.

Podczas rozpoczynania terapii, a następnie w regularnych odstępach czasu, lekarz prowadzący będzie informował Panią o ryzyku teratogennym i niezbędnych działaniach minimalizujących to ryzyko.

Przed rozpoczęciem terapii należy wykonać test ciążowy i uzyskać wynik negatywny, który powinien być zweryfikowany przez lekarza.

Lekarz poinformuje Panią o potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji podczas terapii i przez 2 miesiące po jego zakończeniu. Należy porozmawiać z lekarzem o najbardziej skutecznych formach antykoncepcji dostępnych dla Pani.

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania leku Fingolimod +pharma, przekazanej przez lekarza.

Podczas przyjmowania leku Fingolimod +pharma

Pacjentki nie mogą zajść w ciążę podczas terapii i przez 2 miesiące po jej zakończeniu.

Pacjentki muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania leku Fingolimod +pharma.

Testy ciążowe należy powtarzać w odpowiednich odstępach czasu.

Lekarz prowadzący będzie regularnie informował pacjentkę o poważnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku Fingolimod +pharma dla płodu.

Jeśli zajdzie Pani w ciążę lub jeśli chce Pani zajść w ciążę, należy omówić to z lekarzem, ponieważ terapia lekiem Fingolimod +pharma musi zostać przerwana.

W przypadku ciąży lekarz udzieli Pani informacji.

Lekarz udzieli Pani porady medycznej dotyczącej szkodliwego wpływu leku Fingolimod +pharma na płód i przekaże ocenę potencjalnych skutków terapii.

Należy wykonać badanie ultrasonograficzne i zakończyć terapię lekiem Fingolimod +pharma.

Po zakończeniu leczenia lekiem Fingolimod +pharma

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli uważa Pani, że występujące u Pani SM nasila się (np. występuje osłabienie lub zaburzenia widzenia) lub jeśli zauważy Pani jakiegokolwiek nowe objawy po zakończeniu terapii lekiem Fingolimod +pharma z powodu ciąży.

Konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji przez 2 miesiące po zakończeniu terapii lekiem Fingolimod +pharma z uwagi na czas, jaki jest potrzebny, aby lek Fingolimod +pharma został usunięty z organizmu.

